



HEALTH IS GOOD

by DoutresGroup

ÉDITION 2026

EUR

Bilans de santé

Health Is Good est la branche de coordination de soins de DOUTRES Group. Nous accompagnons les patients internationaux et leurs familles dans la préparation de leur parcours, les échanges avec les prestataires et la coordination des rendez-vous en Chine.

Base

140-150 €

par personne

Hommes	140 €
Femmes — non mariées	140 €
Femmes — mariées	150 €

[Programme complet →](#)

Avancé

290-300 €

par personne

Hommes	290 €
Femmes — non mariées	290 €
Femmes — mariées	300 €

[Programme complet →](#)

Haut de gamme

680-690 €

par personne

Hommes	680 €
Femmes — non mariées	680 €
Femmes — mariées	690 €

[Programme complet →](#)

Ces forfaits de bilan de santé sont présentés par Health Is Good. Les examens sont réalisés par des prestataires de santé ; leur pertinence et les décisions médicales relèvent de professionnels qualifiés.

Les tarifs sont exprimés en euros (EUR). Les inclusions dépendent de la colonne applicable. La disponibilité, la pertinence des examens, le périmètre de coordination et les conditions définitives doivent être confirmés avec HIG avant réservation.

Comparez les forfaits

Consultez les fiches des forfaits pour la liste complète des examens et le comparatif pour une vue d'ensemble.

Élément comparé	Forfait de base	Forfait avancé	Forfait haut de gamme
Nombre total d'examens	Environ 41 examens	Environ 62 examens	Environ 78 examens
Tarif : hommes / femmes non mariées / femmes mariées (EUR)	140 € / 140 € / 150 €	290 € / 290 € / 300 €	680 € / 680 € / 690 €
Examens ophtalmologiques	Lampe à fente, examen externe de l'œil, acuité visuelle	Lampe à fente, examen externe de l'œil, acuité visuelle + fond d'œil et pression intraoculaire	Lampe à fente, examen externe de l'œil, acuité visuelle, fond d'œil et pression intraoculaire + photographie du fond d'œil et ajout de l'audiométrie
Examen bucco-dentaire	Non inclus	Examen bucco-dentaire	Examen bucco-dentaire
Dépistage des cancers gynécologiques	Dépistage du cancer du col par cytologie en couche mince (TCT)	Dépistage du cancer du col par TCT + génotypage du HPV (≥23 types)	Dépistage du cancer du col par TCT + génotypage du HPV (≥23 types)
Marqueurs tumoraux	CEA, AFP, PSA, CA125, CA15-3 (5 paramètres)	Ajout de CA19-9, CA50, CA242, CA72-4, Cyfra21-1, NSE, SCC, TSGF (13 paramètres au total)	Ajout des IgA contre le virus d'Epstein-Barr (cancer du nasopharynx) (14 paramètres au total)
Métabolisme glucidique	Glycémie à jeun + hémoglobine glyquée	Glycémie à jeun + hémoglobine glyquée	Glycémie à jeun + hémoglobine glyquée + adiponectine (ADPN)
Thyroïde	Bilan thyroïdien—3 paramètres	Bilan thyroïdien—3 paramètres	Nouveau : Bilan thyroïdien—5 paramètres (+ T3/T4 libres)
Fonction rénale	Fonction rénale—3 paramètres	Fonction rénale—3 paramètres + cystatine C sérique	Fonction rénale—3 paramètres + cystatine C sérique



Élément comparé	Forfait de base	Forfait avancé	Forfait haut de gamme
Lipides sanguins	Bilan lipidique—5 paramètres	Nouveau : Bilan lipidique—9 paramètres (+ apolipoprotéines A1/B et lipoprotéine(a))	Nouveau : Bilan lipidique—9 paramètres (+ apolipoprotéines A1/B et lipoprotéine(a))
Anémie / vitamines	Non inclus	Non inclus	Nouveau : Folates + vitamine B12
Inflammation / rhumatologie	Non inclus	Non inclus	Nouveau : CRP ultrasensible, Lp-PLA2, RF, ASO, CKMB
Cardiovasculaire / cérébrovasculaire	ECG, hémothéologie	ECG, hémothéologie + échocardiographie Doppler couleur, Doppler couleur des carotides et homocystéine sanguine	ECG, hémothéologie, échocardiographie Doppler couleur, Doppler couleur des carotides et homocystéine sanguine + évaluation de l'artériosclérose et fonction respiratoire
Imagerie—estomac	Test respiratoire au carbone 14 (Helicobacter pylori)	Test respiratoire au carbone 14	Nouveau : Gastroskopie par capsule à contrôle magnétique + gastrine-17 + test respiratoire au carbone 13
Imagerie—densité osseuse	Non inclus	Non inclus	Nouveau : Mesure de la densité osseuse par ultrasons
Imagerie—tête et cou	Aucun	Nouveau : IRM crânienne sans injection, radiographie numérique du rachis cervical	IRM crânienne sans injection, radiographie numérique du rachis cervical + radiographie numérique du rachis lombaire
Imagerie—thorax	Scanner thoracique	Scanner thoracique	Scanner thoracique
Examens échographiques	Foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, reins, thyroïde, seins, prostate, utérus et annexes ; échographie par voie vaginale	Foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, reins, thyroïde, seins, prostate, utérus et annexes ; échographie par voie vaginale + Doppler couleur des carotides et du cœur	Foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, reins, thyroïde, seins, prostate, utérus et annexes ; échographie par voie vaginale + Doppler couleur des carotides et du cœur

Base

Tarif du forfait (EUR / personne)

Hommes: 140 € | Femmes — non mariées: 140 € | Femmes — mariées: 150 €

★ Inclus — Non indiqué dans cette catégorie. Les critères d'éligibilité sont confirmés par le prestataire.

Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examens cliniques					
Examen général	★	★	★	Les mesures de base de l'état de santé, notamment la taille, le poids et la pression artérielle, permettent d'évaluer si le poids est normal ou s'il existe une insuffisance pondérale, un surpoids ou une obésité, et fournissent des éléments utiles au diagnostic dans les services concernés.	Taille ; Poids ; Indice de masse corporelle ; Poids idéal ; Pression artérielle systolique ; Pression artérielle diastolique ; Pouls
Examen chirurgical	★	—	—	Recherche d'une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, d'anomalies de la thyroïde, des seins, des organes génitaux externes, de la prostate et de la région anorectale, ainsi que de déformations des membres ou du rachis.	Prostate ; Toucher rectal ; Peau ; Ganglions lymphatiques superficiels ; Thyroïde ; Seins ; Rachis ; Articulations des membres ; Organes génitaux externes ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen chirurgical	—	★	★	Recherche d'une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, d'anomalies de la thyroïde, des seins et de la région anorectale, ainsi que de déformations des membres ou du rachis.	Toucher rectal ; Thyroïde ; Ganglions lymphatiques superficiels ; Peau ; Autres ; Articulations des membres ; Rachis ; Seins ; Antécédents médicaux



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Médecine interne				Recherche d'anomalies cardiaques ou pulmonaires, d'une augmentation de volume du foie ou de la rate et de masses abdominales.	Thorax ; Cœur—fréquence ; Cœur—souffles ; Cœur—rythme ; Cœur—bruits ; Cœur—limites ; Poumons—fréquence respiratoire ; Poumons—râles ; Poumons—bruits respiratoires ; Poumons—frottement pleural ; Foie—taille ; Foie—consistance ; Foie—sensibilité à la palpation ; Vésicule biliaire—taille ; Vésicule biliaire—sensibilité à la palpation ; Rate—taille ; Rate—consistance ; Rate—sensibilité à la palpation ; Reins—douleur à la percussion ; Paroi abdominale ; Réflexe rotulien ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents familiaux
Examen à la lampe à fente Ophtalmologie	★	★	★	Recherche d'anomalies de la cornée et du cristallin, notamment une cataracte.	Cornée ; Chambre antérieure ; Iris ; Pupille ; Cristallin ; Corps vitré
Examen externe de l'œil Ophtalmologie	★	★	★	Vérification de l'aspect externe des yeux et recherche d'affections telles que le trachome et la conjonctivite.	Paupières ; Appareil lacrymal ; Conjonctive ; Sclère ; Globe oculaire ; Autres ; Antécédents médicaux
Acuité visuelle Évaluation de l'acuité visuelle et de la vision des couleurs	★	★	★	Mesure principalement l'acuité visuelle afin de repérer une anomalie de la vision.	Acuité visuelle sans correction—œil gauche ; Acuité visuelle sans correction—œil droit ; Acuité visuelle avec correction—œil gauche ; Acuité visuelle avec correction—œil droit
Examen ORL 1 Oto-rhino-laryngologie (ORL)	★	★	★	Recherche d'anomalies des oreilles, du nez, du pharynx et du larynx, telles qu'une otite moyenne, une perforation du tympan ou une hypertrophie des amygdales.	Pavillon de l'oreille ; Conduit auditif externe ; Tympan ; Mastoïde ; Aspect externe du nez ; Cloison nasale ; Cornets nasaux ; Muqueuse nasale ; Sinus paranasaux ; Lurette ; Amygdales ; Muqueuse pharyngée ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen gynécologique de routine Gynécologie	—	—	★	Recherche de modifications anormales des organes génitaux féminins et de lésions du col de l'utérus ou du vagin.	Utérus ; Annexes ; Vulve ; Vagin ; Col de l'utérus ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents menstruels et obstétricaux
Analyse courante des sécrétions vaginales	—	—	★	Examen gynécologique courant utilisé dans l'évaluation des inflammations, des tumeurs et d'autres maladies de l'appareil reproducteur féminin ; il fournit des éléments importants pour le diagnostic clinique des affections vaginales.	Degré de propreté vaginale ; Cellules indicatrices (clue cells) ; Trichomonas ; Champignons ; Leucocytes ; Hématies ; Cellules épithéliales ; pH ; Autres



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Cytologie en couche mince en milieu liquide Cytologie en couche mince (TCT)	—	—	★	Dépistage du cancer du col de l'utérus	Cytologie en couche mince en milieu liquide
ECG de repos Électrocardiogramme (ECG)	★	★	★	Utilisé pour rechercher des affections cardiaques telles qu'un infarctus du myocarde, des troubles du rythme et une ischémie myocardique.	ECG standard à 12 dérivations
Analyses biologiques					
NFS avec formule leucocytaire à 5 populations Numération formule sanguine (NFS)	★	★	★	L'un des examens de première intention les plus courants en pratique clinique ; il fournit des éléments utiles au diagnostic des maladies hématologiques et d'autres affections.	Numération des leucocytes ; Proportion de grandes plaquettes ; Numération des grandes plaquettes ; Hématocrite ; Hémoglobine ; Indice de distribution des globules rouges—coefficient de variation ; Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Numération des plaquettes ; Pourcentage de neutrophiles ; Numération absolue des neutrophiles ; Pourcentage de lymphocytes ; Numération absolue des lymphocytes ; Numération des hématies ; Volume plaquettaire moyen ; Volume globulaire moyen ; Thrombocrite ; Indice de distribution des globules rouges—écart-type ; Indice de distribution plaquettaire ; Pourcentage de monocytes ; Numération absolue des monocytes ; Pourcentage d'éosinophiles ; Numération absolue des éosinophiles ; Pourcentage de basophiles ; Numération absolue des basophiles ; Numération absolue des érythroblastes ; Pourcentage d'érythroblastes ; Pourcentage de granulocytes immatures ; Numération des granulocytes immatures



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Analyse d'urine de routine	★	★	★	Peut orienter vers une affection urinaire : néphrite aiguë ou chronique, pyélonéphrite, cystite, urétrite, syndrome néphrotique, néphrite lupique, hémoglobinurie, infarctus rénal, nécrose tubulaire rénale aiguë due à des sels de métaux lourds ou à des médicaments, tumeur du rein ou de la vessie. Recherche également la présence de glucose dans les urines.	Sang occulte urinaire ; Densité urinaire ; Glucose urinaire ; Protéines urinaires ; Bilirubine urinaire ; Limpidité des urines ; Leucocytes urinaires (microscopie) ; Hématies urinaires (microscopie) ; Urobilinogène ; Nitrites urinaires ; Cristaux urinaires (microscopie) ; Corps cétoniques urinaires ; Estérase leucocytaire urinaire ; Autres éléments urinaires ; Couleur des urines ; pH urinaire ; Cylindres urinaires (microscopie) ; Vitamine C urinaire ; Cellules épithéliales urinaires (microscopie)
Hémorhéologie	★	★	★	Présente un certain intérêt pour la prévention et le diagnostic des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.	Viscosité du sang total (1/s) ; Viscosité du sang total (30/s) ; Viscosité du sang total (50/s) ; Viscosité du sang total (200/s) ; Viscosité plasmatique ; Viscosité réduite du sang total (1/s) ; Viscosité réduite du sang total (30/s) ; Indice d'agrégation érythrocytaire ; Indice de rigidité érythrocytaire ; Indice de déformabilité érythrocytaire
Fonction rénale—3 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Évalue la fonction rénale et le risque de maladie rénale.	Urée sérique ; Acide urique sérique ; Créatinine sérique
Dosage de la créatine kinase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la créatine kinase (CK), l'un des examens couramment utilisés dans l'évaluation cardiaque.	Créatine kinase sérique
Dosage de l'α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Contribue à améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic de la maladie coronarienne, reflète l'importance des lésions myocardiques et peut servir à évaluer la réponse au traitement et le pronostic.	α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique
Dosage de la lactate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la lactate déshydrogénase sérique, l'un des examens couramment utilisés dans les bilans cardiaque et hépatique.	Lactate déshydrogénase sérique



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Bilan lipidique—5 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Paramètres importants pour la détection précoce d'une hyperlipidémie, l'aide au diagnostic de l'athérosclérose, l'évaluation du risque de maladie coronarienne et d'infarctus cérébral, ainsi que le suivi de l'efficacité des traitements médicamenteux.	Indice d'athérogénicité (calculé) ; Cholestérol total sérique ; Triglycérides sériques ; Cholestérol HDL sérique ; Cholestérol LDL sérique
Bilan hépatique—11 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Interprétées avec les données cliniques, ces analyses servent principalement au diagnostic biologique des affections hépatobiliaires. Elles reflètent les lésions hépatiques aiguës ou chroniques et les maladies de la vésicule biliaire, notamment l'hépatite infectieuse aiguë, la toxicité médicamenteuse ou alcoolique, l'hépatite chronique, la stéatose hépatique, la cirrhose, la lithiase biliaire, l'obstruction biliaire extrahépatique et l'ictère lié à des lésions hépatocellulaires.	Rapport albumine/globulines (calculé) ; Protéines totales sériques ; Albumine sérique ; Bilirubine totale sérique ; Bilirubine directe sérique (conjuguée) ; Bilirubine indirecte sérique (calculée, non conjuguée) ; Alanine aminotransférase sérique ; Aspartate aminotransférase sérique ; γ-glutamyltransférase sérique ; Globulines sériques (calculées) ; Rapport aspartate aminotransférase/alanine aminotransférase (calculé)
Dosage quantitatif de l'antigène carcinoembryonnaire Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur tumoral à large spectre pouvant orienter notamment vers un cancer du rectum, du côlon, du poumon, du sein ou du pancréas.	Antigène carcinoembryonnaire (dosage quantitatif)
Dosage de l'antigène prostatique spécifique total Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur spécifique utilisé pour le dépistage des tumeurs prostatiques ; une hyperplasie de la prostate ou une inflammation peut également entraîner une légère élévation.	Antigène prostatique spécifique total
Dosage de l'antigène prostatique spécifique libre Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur complémentaire du cancer de la prostate pouvant être utilisé dans son dépistage.	Antigène prostatique spécifique libre
Dosage quantitatif de l'alpha-fœtoprotéine Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Peut orienter notamment vers un cancer primitif du foie, une tumeur embryonnaire des gonades ou une cirrhose.	Alpha-fœtoprotéine (dosage quantitatif)



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Dosage de l'antigène glucidique 125 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 125, un marqueur tumoral principalement utilisé comme aide au diagnostic des cancers ovariens séreux malins et épithéliaux, ainsi que pour le suivi après chirurgie et chimiothérapie du cancer de l'ovaire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 125
Dosage de l'antigène glucidique 153 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 15-3, un marqueur tumoral présentant un intérêt pour le diagnostic du cancer du sein et le suivi postopératoire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 15-3
Bilan thyroïdien—3 paramètres Bilan thyroïdien	★	★	★	Contribue au diagnostic des maladies ou des dysfonctionnements thyroïdiens et figure parmi les examens endocriniens les plus courants.	Thyréostimuline sérique ; Thyroxine sérique ; Triiodothyronine sérique
Hémoglobine glyquée Bilan du diabète	★	★	★	Reflète la glycémie des 2 à 3 mois précédents et constitue un indicateur utilisé dans le dépistage du diabète.	Hémoglobine glyquée (méthode biochimique)
Glycémie à jeun Bilan du diabète	★	★	★	La glycémie correspond au taux de glucose dans le sang. Elle joue un rôle important dans l'évaluation du métabolisme glucidique, le diagnostic des troubles qui l'affectent et l'élaboration ou l'adaptation des traitements par les cliniciens.	Glycémie à jeun
Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 14 Test respiratoire à l'urée	★	★	★	Test respiratoire recherchant une infection gastrique à Helicobacter pylori. Cette infection est étroitement associée à la gastrite, à l'ulcère gastroduodénal et au cancer de l'estomac.	Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 14



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examens d'imagerie					
Échographie Doppler couleur de l'utérus et des annexes Échographie Doppler couleur courante—gynécologie	—	★	—	Permet de mieux visualiser l'utérus, les ovaires et les organes reproducteurs pelviens afin de rechercher des lésions.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie abdominale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie abdominale)
Échographie Doppler couleur du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, du pancréas et des reins Échographie Doppler couleur courante—abdomen	★	★	★	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur des deux reins ; Échographie Doppler couleur du foie ; Échographie Doppler couleur de la vésicule biliaire ; Échographie Doppler couleur de la rate ; Échographie Doppler couleur du pancréas
Échographie Doppler couleur de la prostate Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Visualise la forme et la taille de la prostate et contribue à l'évaluation d'affections telles que l'hyperplasie, l'augmentation de volume et les calcifications prostatiques. Fournit des images échographiques en coupe, dynamiques, en couleur et en haute définition à visée diagnostique.	Échographie Doppler couleur de la prostate
Échographie Doppler couleur de la vessie et des uretères Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur de la vessie ; Échographie Doppler couleur des uretères
Échographie Doppler couleur de la thyroïde Échographie Doppler couleur des organes superficiels—glandes salivaires, thyroïde et ganglions cervicaux	★	★	★	Étudie la structure et la morphologie de la thyroïde afin de repérer des lésions anormales.	Échographie Doppler couleur de la thyroïde



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Échographie Doppler couleur par voie vaginale Échographie Doppler couleur endocavitaire	—	—	★	Permet d'approcher directement les organes pelviens pour mieux visualiser les éventuelles lésions de l'utérus, des ovaires et du pelvis.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie vaginale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie vaginale)
Échographie Doppler couleur des seins Échographie mammaire	—	★	★	Peut mettre en évidence des nodules mammaires ou d'autres lésions occupant de l'espace dans le sein.	Échographie mammaire
Scanner thoracique Scanner thoracique hélicoïdal à faible dose	★	★	★	Utilisé pour explorer les maladies des poumons, du cœur, de l'aorte, du médiastin et du diaphragme.	Scanner thoracique sans injection
Autres					
Synthèse médicale du bilan Autres	★	★	★		
Prélèvement sanguin Autres	★	★	★		
Petit-déjeuner Autres	★	★	★		

Avancé

Tarif du forfait (EUR / personne)

Hommes: 290 € | Femmes — non mariées: 290 € | Femmes — mariées: 300 €

★ Inclus — Non indiqué dans cette catégorie. Les critères d'éligibilité sont confirmés par le prestataire.

Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examens cliniques					
Examen général	★	★	★	Les mesures de base de l'état de santé, notamment la taille, le poids et la pression artérielle, permettent d'évaluer si le poids est normal ou s'il existe une insuffisance pondérale, un surpoids ou une obésité, et fournissent des éléments utiles au diagnostic dans les services concernés.	Taille ; Poids ; Indice de masse corporelle ; Poids idéal ; Pression artérielle systolique ; Pression artérielle diastolique ; Pouls
Examen chirurgical	★	—	—	Recherche d'une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, d'anomalies de la thyroïde, des seins, des organes génitaux externes, de la prostate et de la région anorectale, ainsi que de déformations des membres ou du rachis.	Prostate ; Toucher rectal ; Peau ; Ganglions lymphatiques superficiels ; Thyroïde ; Seins ; Rachis ; Articulations des membres ; Organes génitaux externes ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen chirurgical	—	★	★	Recherche d'une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, d'anomalies de la thyroïde, des seins et de la région anorectale, ainsi que de déformations des membres ou du rachis.	Toucher rectal ; Thyroïde ; Ganglions lymphatiques superficiels ; Peau ; Autres ; Articulations des membres ; Rachis ; Seins ; Antécédents médicaux



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Médecine interne				Recherche d'anomalies cardiaques ou pulmonaires, d'une augmentation de volume du foie ou de la rate et de masses abdominales.	Thorax ; Cœur—fréquence ; Cœur—souffles ; Cœur—rythme ; Cœur—bruits ; Cœur—limites ; Poumons—fréquence respiratoire ; Poumons—râles ; Poumons—bruits respiratoires ; Poumons—frottement pleural ; Foie—taille ; Foie—consistance ; Foie—sensibilité à la palpation ; Vésicule biliaire—taille ; Vésicule biliaire—sensibilité à la palpation ; Rate—taille ; Rate—consistance ; Rate—sensibilité à la palpation ; Reins—douleur à la percussion ; Paroi abdominale ; Réflexe rotulien ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents familiaux
Examen externe de l'œil Ophtalmologie	★	★	★	Vérification de l'aspect externe des yeux et recherche d'affections telles que le trachome et la conjonctivite.	Paupières ; Appareil lacrymal ; Conjonctive ; Sclère ; Globe oculaire ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen du fond d'œil Ophtalmologie	★	★	★	Examen du fond d'œil à l'ophtalmoscope pour rechercher notamment une dégénérescence maculaire ou une artériosclérose.	Papille optique ; Macula ; Rétine
Examen à la lampe à fente Ophtalmologie	★	★	★	Recherche d'anomalies de la cornée et du cristallin, notamment une cataracte.	Cornée ; Chambre antérieure ; Iris ; Pupille ; Cristallin ; Corps vitré
Acuité visuelle Évaluation de l'acuité visuelle et de la vision des couleurs	★	★	★	Mesure principalement l'acuité visuelle afin de repérer une anomalie de la vision.	Acuité visuelle sans correction—œil gauche ; Acuité visuelle sans correction—œil droit ; Acuité visuelle avec correction—œil gauche ; Acuité visuelle avec correction—œil droit
Pression intraoculaire Tonométrie sans contact	★	★	★	La pression intraoculaire est la pression à l'intérieur du globe oculaire : elle correspond à la pression équilibrée exercée par le contenu de l'œil sur sa paroi. Chez une personne en bonne santé, elle reste dans une plage stable afin de maintenir la forme normale de l'œil et de permettre un fonctionnement optique optimal des milieux réfractifs. La plage normale est de 1,47 à 2,79 kPa (11 à 21 mmHg). Cet examen mesure la pression à l'intérieur de l'œil.	Pression intraoculaire—œil gauche ; Pression intraoculaire—œil droit



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examen ORL 1 Oto-rhino-laryngologie (ORL)	★	★	★	Recherche d'anomalies des oreilles, du nez, du pharynx et du larynx, telles qu'une otite moyenne, une perforation du tympan ou une hypertrophie des amygdales.	Pavillon de l'oreille ; Conduit auditif externe ; Tympan ; Mastoïde ; Aspect externe du nez ; Cloison nasale ; Cornets nasaux ; Muqueuse nasale ; Sinus paranasaux ; Luvette ; Amygdales ; Muqueuse pharyngée ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen bucco-dentaire Odontologie	★	★	★	Permet de rechercher précocement des caries, une gingivite ou une parodontite, et de fournir des conseils d'hygiène bucco-dentaire.	Muqueuse buccale ; Gencives ; Parodontite ; Caries ; Dents manquantes ; Mobilité dentaire ; Prothèses dentaires ; Articulation temporomandibulaire ; Glandes parotides ; Langue ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen gynécologique de routine Gynécologie	—	—	★	Recherche de modifications anormales des organes génitaux féminins et de lésions du col de l'utérus ou du vagin.	Utérus ; Annexes ; Vulve ; Vagin ; Col de l'utérus ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents menstruels et obstétricaux
Analyse courante des sécrétions vaginales Gynécologie	—	—	★	Examen gynécologique courant utilisé dans l'évaluation des inflammations, des tumeurs et d'autres maladies de l'appareil reproducteur féminin ; il fournit des éléments importants pour le diagnostic clinique des affections vaginales.	Degré de propreté vaginale ; Cellules indicatrices (clue cells) ; Trichomonas ; Champignons ; Leucocytes ; Hématies ; Cellules épithéliales ; pH ; Autres



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Génotypage du HPV (au moins 23 types) Gynécologie	—	—	★	Indicateur important du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le HPV peut directement provoquer ce cancer. Toutefois, toutes les personnes positives au HPV ne développeront pas un cancer du col : un résultat positif identifie un groupe à risque accru.	HPV 18 (type à haut risque) ; HPV 31 (type à haut risque) ; HPV 33 (type à haut risque) ; HPV 35 (type à haut risque) ; HPV 39 (type à haut risque) ; HPV 45 (type à haut risque) ; HPV 51 (type à haut risque) ; HPV 52 (type à haut risque) ; HPV 56 (type à haut risque) ; HPV 58 (type à haut risque) ; HPV 59 (type à haut risque) ; HPV 68 (type à haut risque) ; HPV 6 (type à bas risque) ; HPV 11 (type à bas risque) ; HPV 26 (type à haut risque) ; HPV 55 (type à bas risque) ; HPV 66 (type à haut risque) ; HPV 82 (type à haut risque) ; HPV 83 (type à bas risque) ; HPV 40 (type à bas risque) ; HPV 42 (type à bas risque) ; HPV 43 (type à bas risque) ; HPV 61 (type à bas risque) ; HPV 44 (type à bas risque) ; HPV 53 (type à haut risque) ; HPV 81 (type à bas risque) ; HPV 73 (type à haut risque) ; HPV 84 (type à bas risque) ; Génotypage des papillomavirus humains—12 autres types de HPV à haut risque ; HPV 67 (type à bas risque) ; HPV 57 (type à bas risque) ; HPV 70 (type à bas risque) ; HPV 16 (type à haut risque) ; HPV 18, 39, 45, 59, 68 ; HPV 51, 53, 56, 66, 73 ; HPV 54 (type à bas risque) ; HPV 34 (type à bas risque) ; HPV 69 (type à bas risque) ; HPV 71 (type à bas risque) ; HPV 72 (type à bas risque)
Cytologie en couche mince en milieu liquide Gynécologie	—	—	★	Dépistage du cancer du col de l'utérus	Cytologie en couche mince en milieu liquide
ECG de repos Électrocardiogramme (ECG)	★	★	★	Utilisé pour rechercher des affections cardiaques telles qu'un infarctus du myocarde, des troubles du rythme et une ischémie myocardique.	ECG standard à 12 dérivations
Analyse de la composition corporelle	★	★	★	Mesure rapidement des indicateurs de santé tels que le poids et le pourcentage de masse grasse.	Analyse de la composition corporelle



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Analyses biologiques					
NFS avec formule leucocytaire à 5 populations Numération formule sanguine (NFS)	★	★	★	L'un des examens de première intention les plus courants en pratique clinique ; il fournit des éléments utiles au diagnostic des maladies hématologiques et d'autres affections.	Numération des leucocytes ; Proportion de grandes plaquettes ; Numération des grandes plaquettes ; Hématocrite ; Hémoglobine ; Indice de distribution des globules rouges—coefficient de variation ; Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Numération des plaquettes ; Pourcentage de neutrophiles ; Numération absolue des neutrophiles ; Pourcentage de lymphocytes ; Numération absolue des lymphocytes ; Numération des hématies ; Volume plaquettaire moyen ; Volume globulaire moyen ; Thrombocrite ; Indice de distribution des globules rouges—écart-type ; Indice de distribution plaquettaire ; Pourcentage de monocytes ; Numération absolue des monocytes ; Pourcentage d'éosinophiles ; Numération absolue des éosinophiles ; Pourcentage de basophiles ; Numération absolue des basophiles ; Numération absolue des érythroblastes ; Pourcentage d'érythroblastes ; Pourcentage de granulocytes immatures ; Numération des granulocytes immatures
Analyse d'urine de routine	★	★	★	Peut orienter vers une affection urinaire : néphrite aiguë ou chronique, pyélonéphrite, cystite, urétrite, syndrome néphrotique, néphrite lupique, hémoglobinurie, infarctus rénal, nécrose tubulaire rénale aiguë due à des sels de métaux lourds ou à des médicaments, tumeur du rein ou de la vessie. Recherche également la présence de glucose dans les urines.	Sang occulte urinaire ; Densité urinaire ; Glucose urinaire ; Protéines urinaires ; Bilirubine urinaire ; Limpidité des urines ; Leucocytes urinaires (microscopie) ; Hématies urinaires (microscopie) ; Urobilinogène ; Nitrites urinaires ; Cristaux urinaires (microscopie) ; Corps cétoniques urinaires ; Estérase leucocytaire urinaire ; Autres éléments urinaires ; Couleur des urines ; pH urinaire ; Cylindres urinaires (microscopie) ; Vitamine C urinaire ; Cellules épithéliales urinaires (microscopie)
Test immunochimique fécal quantitatif (qFIT) Sang occulte dans les selles	★	★	★	Recherche un saignement digestif de diverses origines et constitue un indicateur important de dépistage pour le diagnostic précoce des cancers digestifs.	Test immunochimique fécal quantitatif (qFIT)



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Hémorhéologie 	★	★	★	Présente un certain intérêt pour la prévention et le diagnostic des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.	Viscosité du sang total (1/s) ; Viscosité du sang total (30/s) ; Viscosité du sang total (50/s) ; Viscosité du sang total (200/s) ; Viscosité plasmatique ; Viscosité réduite du sang total (1/s) ; Viscosité réduite du sang total (30/s) ; Indice d'agrégation érythrocytaire ; Indice de rigidité érythrocytaire ; Indice de déformabilité érythrocytaire
Fonction rénale—3 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Évalue la fonction rénale et le risque de maladie rénale.	Urée sérique ; Acide urique sérique ; Créatinine sérique
Dosage de la cystatine sérique Analyses biochimiques	★	★	★	L'un des indicateurs sensibles d'une altération de la fonction rénale.	Cystatine C sérique
Bilan hépatique—11 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Interprétées avec les données cliniques, ces analyses servent principalement au diagnostic biologique des affections hépatobiliaires. Elles reflètent les lésions hépatiques aiguës ou chroniques et les maladies de la vésicule biliaire, notamment l'hépatite infectieuse aiguë, la toxicité médicamenteuse ou alcoolique, l'hépatite chronique, la stéatose hépatique, la cirrhose, la lithiase biliaire, l'obstruction biliaire extrahépatique et l'ictère lié à des lésions hépatocellulaires.	Rapport albumine/globulines (calculé) ; Protéines totales sériques ; Albumine sérique ; Bilirubine totale sérique ; Bilirubine directe sérique (conjuguée) ; Bilirubine indirecte sérique (calculée, non conjuguée) ; Alanine aminotransférase sérique ; Aspartate aminotransférase sérique ; γ-glutamyltransférase sérique ; Globulines sériques (calculées) ; Rapport aspartate aminotransférase/alanine aminotransférase (calculé)
Bilan lipidique—9 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Paramètres importants pour la détection précoce d'une hyperlipidémie, l'aide au diagnostic de l'athérosclérose, l'évaluation du risque de maladie coronarienne et d'infarctus cérébral, ainsi que le suivi de l'efficacité des traitements médicamenteux.	Indice d'athérogénicité (calculé) ; Cholestérol total sérique ; Triglycérides sériques ; Cholestérol HDL sérique ; Cholestérol LDL sérique ; Apolipoprotéine A1 sérique ; Apolipoprotéine B sérique ; Lipoprotéine(a) ; Rapport apolipoprotéine A1/apolipoprotéine B (calculé)
Dosage de la lactate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la lactate déshydrogénase sérique, l'un des examens couramment utilisés dans les bilans cardiaque et hépatique.	Lactate déshydrogénase sérique



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Dosage de l'α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Contribue à améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic de la maladie coronarienne, reflète l'importance des lésions myocardiques et peut servir à évaluer la réponse au traitement et le pronostic.	α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique
Dosage de la créatine kinase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la créatine kinase (CK), l'un des examens couramment utilisés dans l'évaluation cardiaque.	Créatine kinase sérique
Dosage de l'homocystéine sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Marqueur du risque cardiovasculaire pouvant être utilisé comme facteur d'évaluation du risque de survenue d'une maladie.	Homocystéine sanguine
Dosage de l'antigène glucidique 50 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 50, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 50
Dosage de l'antigène glucidique 242 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 242, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 242
Dosage du fragment de cytokératine 19 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Le dosage du fragment de cytokératine 19 est un indicateur important pour le diagnostic différentiel, le suivi thérapeutique et l'évaluation du pronostic du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC).	Fragment de cytokératine 19
Dosage de l'antigène glucidique 724 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 72-4, qui peut servir de marqueur des tumeurs digestives. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 72-4
Dosage de l'antigène associé au carcinome épidermoïde Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur du carcinome épidermoïde, utilisé comme aide au diagnostic et pour le suivi du traitement. Sa spécificité est relativement élevée ; une augmentation importante doit faire suspecter un carcinome épidermoïde.	Antigène associé au carcinome épidermoïde



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Dosage de l'énolase neuronale spécifique Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'énolase neuronale spécifique, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Énolase neuronale spécifique
Dosage de l'antigène glucidique 199 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 19-9, un marqueur des tumeurs digestives. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 19-9
Dosage quantitatif de l'alpha-fœtoprotéine Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Peut orienter notamment vers un cancer primitif du foie, une tumeur embryonnaire des gonades ou une cirrhose.	Alpha-fœtoprotéine (dosage quantitatif)
Dosage quantitatif de l'antigène carcinoembryonnaire Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur tumoral à large spectre pouvant orienter notamment vers un cancer du rectum, du côlon, du poumon, du sein ou du pancréas.	Antigène carcinoembryonnaire (dosage quantitatif)
Dosage de l'antigène prostatique spécifique total Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur spécifique utilisé pour le dépistage des tumeurs prostatiques ; une hyperplasie de la prostate ou une inflammation peut également entraîner une légère élévation.	Antigène prostatique spécifique total
Dosage de l'antigène prostatique spécifique libre Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur complémentaire du cancer de la prostate pouvant être utilisé dans son dépistage.	Antigène prostatique spécifique libre
Dosage de l'antigène glucidique 153 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 15-3, un marqueur tumoral présentant un intérêt pour le diagnostic du cancer du sein et le suivi postopératoire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 15-3



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Dosage de l'antigène glucidique 125 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 125, un marqueur tumoral principalement utilisé comme aide au diagnostic des cancers ovariens séreux malins et épithéliaux, ainsi que pour le suivi après chirurgie et chimiothérapie du cancer de l'ovaire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 125
Dosage du facteur de croissance spécifique des tumeurs Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur tumoral à large spectre utilisé comme aide au diagnostic des tumeurs et pour le suivi des populations à haut risque.	Facteur de croissance spécifique
Fonction gastrique—3 paramètres Bilan de la fonction gastrique	★	★	★	Évalue la sécrétion des glandes digestives de l'estomac afin d'aider à apprécier le risque de maladie gastrique.	Pepsinogène I ; Pepsinogène II ; Rapport des pepsinogènes (calculé)
Bilan thyroïdien—3 paramètres Bilan thyroïdien	★	★	★	Contribue au diagnostic des maladies ou des dysfonctionnements thyroïdiens et figure parmi les examens endocriniens les plus courants.	Thyréostimuline sérique ; Thyroxine sérique ; Triiodothyronine sérique
Glycémie à jeun Bilan du diabète	★	★	★	La glycémie correspond au taux de glucose dans le sang. Elle joue un rôle important dans l'évaluation du métabolisme glucidique, le diagnostic des troubles qui l'affectent et l'élaboration ou l'adaptation des traitements par les cliniciens.	Glycémie à jeun
Hémoglobine glyquée Bilan du diabète	★	★	★	Reflète la glycémie des 2 à 3 mois précédents et constitue un indicateur utilisé dans le dépistage du diabète.	Hémoglobine glyquée (méthode biochimique)
Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 14 Test respiratoire à l'urée	★	★	★	Test respiratoire recherchant une infection gastrique à Helicobacter pylori. Cette infection est étroitement associée à la gastrite, à l'ulcère gastroduodénal et au cancer de l'estomac.	Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 14



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examens d'imagerie					
Échographie Doppler couleur de l'utérus et des annexes Échographie Doppler couleur courante—gynécologie	—	★	—	Permet de mieux visualiser l'utérus, les ovaires et les organes reproducteurs pelviens afin de rechercher des lésions.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie abdominale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie abdominale)
Échographie Doppler couleur du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, du pancréas et des reins Échographie Doppler couleur courante—abdomen	★	★	★	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur des deux reins ; Échographie Doppler couleur du foie ; Échographie Doppler couleur de la vésicule biliaire ; Échographie Doppler couleur de la rate ; Échographie Doppler couleur du pancréas
Échographie Doppler couleur de la prostate Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Visualise la forme et la taille de la prostate et contribue à l'évaluation d'affections telles que l'hyperplasie, l'augmentation de volume et les calcifications prostatiques. Fournit des images échographiques en coupe, dynamiques, en couleur et en haute définition à visée diagnostique.	Échographie Doppler couleur de la prostate
Échographie Doppler couleur de la vessie et des uretères Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur de la vessie ; Échographie Doppler couleur des uretères
Échographie Doppler couleur des carotides Échographie Doppler couleur des vaisseaux du cou	★	★	★	Recherche d'anomalies des grosses artères du cou, telles que des plaques, une sclérose ou un rétrécissement.	Échographie Doppler couleur des carotides



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Échographie Doppler couleur de la thyroïde Échographie Doppler couleur des organes superficiels—glandes salivaires, thyroïde et ganglions cervicaux	★	★	★	Étudie la structure et la morphologie de la thyroïde afin de repérer des lésions anormales.	Échographie Doppler couleur de la thyroïde
Échographie Doppler couleur par voie vaginale Échographie Doppler couleur endocavitaire	—	—	★	Permet d'approcher directement les organes pelviens pour mieux visualiser les éventuelles lésions de l'utérus, des ovaires et du pelvis.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie vaginale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie vaginale)
Échocardiographie Doppler couleur	★	★	★	Méthode importante de diagnostic des maladies cardiovasculaires. Visualise en temps réel les structures des cavités cardiaques, les mouvements du cœur et le flux sanguin, avec un intérêt diagnostique notable pour les cardiopathies congénitales, les cardiomyopathies, la maladie coronarienne, les complications de l'infarctus du myocarde et le cœur pulmonaire.	Échocardiographie Doppler couleur
Échographie Doppler couleur des seins Échographie mammaire	—	★	★	Peut mettre en évidence des nodules mammaires ou d'autres lésions occupant de l'espace dans le sein.	Échographie mammaire
Examen du rachis cervical de profil Radiographie numérique (DR) du rachis cervical	★	★	★	Peut révéler une modification de la courbure cervicale, un pincement des espaces intervertébraux, des excroissances osseuses ou des calcifications ligamentaires.	Radiographie numérique du rachis cervical de profil
Scanner thoracique Scanner thoracique hélicoïdal à faible dose	★	★	★	Utilisé pour explorer les maladies des poumons, du cœur, de l'aorte, du médiastin et du diaphragme.	Scanner thoracique sans injection



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
IRM crânienne sans injection IRM crânienne	★	★	★	L'IRM peut être réalisée dans les situations suivantes : 1. Patients présentant un infarctus cérébral ou une hémorragie cérébrale. 2. Lésions vasculaires. 3. Patients présentant une infection virale, un abcès cérébral ou une méningite. 4. Patients atteints d'une tumeur cérébrale. 5. Nouveau-nés présentant des anomalies cérébrales.	IRM crânienne sans injection
Autres					
Synthèse médicale du bilan Autres	★	★	★		
Prélèvement sanguin Autres	★	★	★		
Petit-déjeuner Autres	★	★	★		

Haut de gamme

Tarif du forfait (EUR / personne)

Hommes: 680 € | Femmes — non mariées: 680 € | Femmes — mariées: 690 €

★ Inclus — Non indiqué dans cette catégorie. Les critères d'éligibilité sont confirmés par le prestataire.

Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examens cliniques					
Examen général	★	★	★	Les mesures de base de l'état de santé, notamment la taille, le poids et la pression artérielle, permettent d'évaluer si le poids est normal ou s'il existe une insuffisance pondérale, un surpoids ou une obésité, et fournissent des éléments utiles au diagnostic dans les services concernés.	Taille ; Poids ; Indice de masse corporelle ; Poids idéal ; Pression artérielle systolique ; Pression artérielle diastolique ; Pouls
Examen chirurgical	—	★	★	Recherche d'une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, d'anomalies de la thyroïde, des seins et de la région anorectale, ainsi que de déformations des membres ou du rachis.	Toucher rectal ; Thyroïde ; Ganglions lymphatiques superficiels ; Peau ; Autres ; Articulations des membres ; Rachis ; Seins ; Antécédents médicaux
Médecine interne	★	★	★	Recherche d'anomalies cardiaques ou pulmonaires, d'une augmentation de volume du foie ou de la rate et de masses abdominales.	Thorax ; Cœur—fréquence ; Cœur—souffles ; Cœur—rythme ; Cœur—bruits ; Cœur—limites ; Poumons—fréquence respiratoire ; Poumons—râles ; Poumons—bruits respiratoires ; Poumons—frottement pleural ; Foie—taille ; Foie—consistance ; Foie—sensibilité à la palpation ; Vésicule biliaire—taille ; Vésicule biliaire—sensibilité à la palpation ; Rate—taille ; Rate—consistance ; Rate—sensibilité à la palpation ; Reins—douleur à la percussion ; Paroi abdominale ; Réflexe rotulien ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents familiaux
Examen à la lampe à fente Ophtalmologie	★	★	★	Recherche d'anomalies de la cornée et du cristallin, notamment une cataracte.	Cornée ; Chambre antérieure ; Iris ; Pupille ; Cristallin ; Corps vitré



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examen du fond d'œil Ophtalmologie	★	★	★	Examen du fond d'œil à l'ophtalmoscope pour rechercher notamment une dégénérescence maculaire ou une artériosclérose.	Papille optique ; Macula ; Rétine
Examen externe de l'œil Ophtalmologie	★	★	★	Vérification de l'aspect externe des yeux et recherche d'affections telles que le trachome et la conjonctivite.	Paupières ; Appareil lacrymal ; Conjonctive ; Sclère ; Globe oculaire ; Autres ; Antécédents médicaux
Photographie du fond d'œil	★	★	★	Recherche les affections courantes du fond d'œil, telles que la rétinopathie diabétique, les atteintes liées à l'âge et les lésions liées à l'hypertension. Peut également fournir des signes d'alerte concernant des maladies systémiques telles que l'hypertension, l'accident vasculaire cérébral ou la maladie coronarienne.	Photographie du fond d'œil
Acuité visuelle Évaluation de l'acuité visuelle et de la vision des couleurs	★	★	★	Mesure principalement l'acuité visuelle afin de repérer une anomalie de la vision.	Acuité visuelle sans correction—œil gauche ; Acuité visuelle sans correction—œil droit ; Acuité visuelle avec correction—œil gauche ; Acuité visuelle avec correction—œil droit
Pression intraoculaire Tonométrie sans contact	★	★	★	La pression intraoculaire est la pression à l'intérieur du globe oculaire : elle correspond à la pression équilibrée exercée par le contenu de l'œil sur sa paroi. Chez une personne en bonne santé, elle reste dans une plage stable afin de maintenir la forme normale de l'œil et de permettre un fonctionnement optique optimal des milieux réfractifs. La plage normale est de 1,47 à 2,79 kPa (11 à 21 mmHg). Cet examen mesure la pression à l'intérieur de l'œil.	Pression intraoculaire—œil gauche ; Pression intraoculaire—œil droit
Examen ORL 1 Oto-rhino-laryngologie (ORL)	★	★	★	Recherche d'anomalies des oreilles, du nez, du pharynx et du larynx, telles qu'une otite moyenne, une perforation du tympan ou une hypertrophie des amygdales.	Pavillon de l'oreille ; Conduit auditif externe ; Tympan ; Mastoïde ; Aspect externe du nez ; Cloison nasale ; Cornets nasaux ; Muqueuse nasale ; Sinus paranasaux ; Lurette ; Amygdales ; Muqueuse pharyngée ; Autres ; Antécédents médicaux



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Audiométrie	★	★	★	Évalue objectivement l'état fonctionnel du système auditif.	Audiométrie
Examen bucco-dentaire Odontologie	★	★	★	Permet de rechercher précocement des caries, une gingivite ou une parodontite, et de fournir des conseils d'hygiène bucco-dentaire.	Muqueuse buccale ; Gencives ; Parodonte ; Caries ; Dents manquantes ; Mobilité dentaire ; Prothèses dentaires ; Articulation temporomandibulaire ; Glandes parotides ; Langue ; Autres ; Antécédents médicaux
Examen gynécologique de routine Gynécologie	—	—	★	Recherche de modifications anormales des organes génitaux féminins et de lésions du col de l'utérus ou du vagin.	Utérus ; Annexes ; Vulve ; Vagin ; Col de l'utérus ; Autres ; Antécédents médicaux ; Antécédents menstruels et obstétricaux
Analyse courante des sécrétions vaginales Gynécologie	—	—	★	Examen gynécologique courant utilisé dans l'évaluation des inflammations, des tumeurs et d'autres maladies de l'appareil reproducteur féminin ; il fournit des éléments importants pour le diagnostic clinique des affections vaginales.	Degré de propreté vaginale ; Cellules indicatrices (clue cells) ; Trichomonas ; Champignons ; Leucocytes ; Hématies ; Cellules épithéliales ; pH ; Autres



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Génotypage du HPV (au moins 23 types) Gynécologie	—	—	★	Indicateur important du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le HPV peut directement provoquer ce cancer. Toutefois, toutes les personnes positives au HPV ne développeront pas un cancer du col : un résultat positif identifie un groupe à risque accru.	HPV 18 (type à haut risque) ; HPV 31 (type à haut risque) ; HPV 33 (type à haut risque) ; HPV 35 (type à haut risque) ; HPV 39 (type à haut risque) ; HPV 45 (type à haut risque) ; HPV 51 (type à haut risque) ; HPV 52 (type à haut risque) ; HPV 56 (type à haut risque) ; HPV 58 (type à haut risque) ; HPV 59 (type à haut risque) ; HPV 68 (type à haut risque) ; HPV 6 (type à bas risque) ; HPV 11 (type à bas risque) ; HPV 26 (type à haut risque) ; HPV 55 (type à bas risque) ; HPV 66 (type à haut risque) ; HPV 82 (type à haut risque) ; HPV 83 (type à bas risque) ; HPV 40 (type à bas risque) ; HPV 42 (type à bas risque) ; HPV 43 (type à bas risque) ; HPV 61 (type à bas risque) ; HPV 44 (type à bas risque) ; HPV 53 (type à haut risque) ; HPV 81 (type à bas risque) ; HPV 73 (type à haut risque) ; HPV 84 (type à bas risque) ; Génotypage des papillomavirus humains—12 autres types de HPV à haut risque ; HPV 67 (type à bas risque) ; HPV 57 (type à bas risque) ; HPV 70 (type à bas risque) ; HPV 16 (type à haut risque) ; HPV 18, 39, 45, 59, 68 ; HPV 51, 53, 56, 66, 73 ; HPV 54 (type à bas risque) ; HPV 34 (type à bas risque) ; HPV 69 (type à bas risque) ; HPV 71 (type à bas risque) ; HPV 72 (type à bas risque)
Cytologie en couche mince en milieu liquide Gynécologie	—	—	★	Dépistage du cancer du col de l'utérus	Cytologie en couche mince en milieu liquide
ECG de repos Électrocardiogramme (ECG)	★	★	★	Utilisé pour rechercher des affections cardiaques telles qu'un infarctus du myocarde, des troubles du rythme et une ischémie myocardique.	ECG standard à 12 dérivations
Analyse de la composition corporelle	★	★	★	Mesure rapidement des indicateurs de santé tels que le poids et le pourcentage de masse grasse.	Analyse de la composition corporelle

Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Mesure de la densité osseuse Évaluation de la densité osseuse par ultrasons	★	★	★	Méthode d'évaluation de la résistance osseuse, principalement utilisée pour le dépistage initial de l'ostéoporose.	Mesure de la densité osseuse par ultrasons
Fonction respiratoire Explorations fonctionnelles respiratoires	★	★	★	Évalue la fonction respiratoire.	Fonction respiratoire
Évaluation de l'artériosclérose	★	★	★	Évalue l'artériosclérose à des fins de caractérisation qualitative et de dépistage.	Évaluation de l'artériosclérose
Gastroscopie par capsule (endoscopie gastrique) Gastroscopie par capsule à contrôle magnétique	★	★	★	Examen non invasif, sans infection, sans rayonnement, sans douleur et sans anesthésie. Une caméra miniature enregistre en continu des images à l'intérieur du tube digestif, ensuite analysées à des fins diagnostiques. Les zones explorables comprennent le cardia, le corps gastrique, l'antre et le pylore.	Gastroscopie par capsule



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Analyses biologiques					
NFS avec formule leucocytaire à 5 populations Numération formule sanguine (NFS)	★	★	★	L'un des examens de première intention les plus courants en pratique clinique ; il fournit des éléments utiles au diagnostic des maladies hématologiques et d'autres affections.	Numération des leucocytes ; Proportion de grandes plaquettes ; Numération des grandes plaquettes ; Hématocrite ; Hémoglobine ; Indice de distribution des globules rouges—coefficient de variation ; Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; Numération des plaquettes ; Pourcentage de neutrophiles ; Numération absolue des neutrophiles ; Pourcentage de lymphocytes ; Numération absolue des lymphocytes ; Numération des hématies ; Volume plaquettaire moyen ; Volume globulaire moyen ; Thrombocrite ; Indice de distribution des globules rouges—écart-type ; Indice de distribution plaquettaire ; Pourcentage de monocytes ; Numération absolue des monocytes ; Pourcentage d'éosinophiles ; Numération absolue des éosinophiles ; Pourcentage de basophiles ; Numération absolue des basophiles ; Numération absolue des érythroblastes ; Pourcentage d'érythroblastes ; Pourcentage de granulocytes immatures ; Numération des granulocytes immatures
Analyse d'urine de routine	★	★	★	Peut orienter vers une affection urinaire : néphrite aiguë ou chronique, pyélonéphrite, cystite, urétrite, syndrome néphrotique, néphrite lupique, hémoglobinurie, infarctus rénal, nécrose tubulaire rénale aiguë due à des sels de métaux lourds ou à des médicaments, tumeur du rein ou de la vessie. Recherche également la présence de glucose dans les urines.	Sang occulte urinaire ; Densité urinaire ; Glucose urinaire ; Protéines urinaires ; Bilirubine urinaire ; Limpidité des urines ; Leucocytes urinaires (microscopie) ; Hématies urinaires (microscopie) ; Urobilinogène ; Nitrites urinaires ; Cristaux urinaires (microscopie) ; Corps cétoniques urinaires ; Estérase leucocytaire urinaire ; Autres éléments urinaires ; Couleur des urines ; pH urinaire ; Cylindres urinaires (microscopie) ; Vitamine C urinaire ; Cellules épithéliales urinaires (microscopie)
Test immunochimique fécal quantitatif (qFIT) Sang occulte dans les selles	★	★	★	Recherche un saignement digestif de diverses origines et constitue un indicateur important de dépistage pour le diagnostic précoce des cancers digestifs.	Test immunochimique fécal quantitatif (qFIT)



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Hémorhéologie	★	★	★	Présente un certain intérêt pour la prévention et le diagnostic des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.	Viscosité du sang total (1/s) ; Viscosité du sang total (30/s) ; Viscosité du sang total (50/s) ; Viscosité du sang total (200/s) ; Viscosité plasmatique ; Viscosité réduite du sang total (1/s) ; Viscosité réduite du sang total (30/s) ; Indice d'agrégation érythrocytaire ; Indice de rigidité érythrocytaire ; Indice de déformabilité érythrocytaire
Protéine C-réactive ultrasensible Analyses biochimiques	★	★	★	Présente un intérêt important pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des inflammations, des lésions tissulaires, des tumeurs malignes et d'autres affections.	Protéine C-réactive ultrasensible
Phospholipase A2 associée aux lipoprotéines (Lp-PLA2) Analyses biochimiques	★	★	—	Les taux de Lp-PLA2 présentent une corrélation positive avec la maladie athéroscléreuse chez les patients concernés.	Phospholipase A2 des lipoprotéines
Fonction rénale—3 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Évalue la fonction rénale et le risque de maladie rénale.	Urée sérique ; Acide urique sérique ; Créatinine sérique
Bilan lipidique—9 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Paramètres importants pour la détection précoce d'une hyperlipidémie, l'aide au diagnostic de l'athérosclérose, l'évaluation du risque de maladie coronarienne et d'infarctus cérébral, ainsi que le suivi de l'efficacité des traitements médicamenteux.	Indice d'athérogénicité (calculé) ; Cholestérol total sérique ; Triglycérides sériques ; Cholestérol HDL sérique ; Cholestérol LDL sérique ; Apolipoprotéine A1 sérique ; Apolipoprotéine B sérique ; Lipoprotéine(a) ; Rapport apolipoprotéine A1/apolipoprotéine B (calculé)
Dosage de la cystatine sérique Analyses biochimiques	★	★	★	L'un des indicateurs sensibles d'une altération de la fonction rénale.	Cystatine C sérique



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Bilan hépatique—11 paramètres Analyses biochimiques	★	★	★	Interprétées avec les données cliniques, ces analyses servent principalement au diagnostic biologique des affections hépatobiliaires. Elles reflètent les lésions hépatiques aiguës ou chroniques et les maladies de la vésicule biliaire, notamment l'hépatite infectieuse aiguë, la toxicité médicamenteuse ou alcoolique, l'hépatite chronique, la stéatose hépatique, la cirrhose, la lithiase biliaire, l'obstruction biliaire extrahépatique et l'ictère lié à des lésions hépatocellulaires.	Rapport albumine/globulines (calculé) ; Protéines totales sériques ; Albumine sérique ; Bilirubine totale sérique ; Bilirubine directe sérique (conjuguée) ; Bilirubine indirecte sérique (calculée, non conjuguée) ; Alanine aminotransférase sérique ; Aspartate aminotransférase sérique ; γ-glutamyltransférase sérique ; Globulines sériques (calculées) ; Rapport aspartate aminotransférase/alanine aminotransférase (calculé)
Dosage de la créatine kinase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la créatine kinase (CK), l'un des examens couramment utilisés dans l'évaluation cardiaque.	Créatine kinase sérique
Dosage de l'homocystéine sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Marqueur du risque cardiovasculaire pouvant être utilisé comme facteur d'évaluation du risque de survenue d'une maladie.	Homocystéine sanguine
Isoenzyme sérique de la créatine kinase Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure l'isoenzyme CKMB, l'un des examens couramment utilisés dans l'évaluation cardiaque.	Isoenzyme sérique de la créatine kinase
Dosage de l'α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Contribue à améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic de la maladie coronarienne, reflète l'importance des lésions myocardiques et peut servir à évaluer la réponse au traitement et le pronostic.	α-hydroxybutyrate déshydrogénase sérique
Dosage de la lactate déshydrogénase sérique Analyses biochimiques	★	★	★	Mesure la lactate déshydrogénase sérique, l'un des examens couramment utilisés dans les bilans cardiaque et hépatique.	Lactate déshydrogénase sérique
Dosage du facteur rhumatoïde Bilan rhumatologique	★	★	★	Analyse biologique des maladies rhumatismales fournissant des éléments utiles à leur diagnostic.	Facteur rhumatoïde



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Antistreptolysines O Bilan rhumatologique	★	★	★	L'une des analyses biologiques couramment utilisées dans le bilan des maladies rhumatismales, apportant des éléments utiles à leur diagnostic.	Antistreptolysines O
Dosage du facteur de croissance spécifique des tumeurs Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur tumoral à large spectre utilisé comme aide au diagnostic des tumeurs et pour le suivi des populations à haut risque.	Facteur de croissance spécifique
Dosage de l'énolase neuronale spécifique Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'énolase neuronale spécifique, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Énolase neuronale spécifique
Dosage de l'antigène associé au carcinome épidermoïde Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur du carcinome épidermoïde, utilisé comme aide au diagnostic et pour le suivi du traitement. Sa spécificité est relativement élevée ; une augmentation importante doit faire suspecter un carcinome épidermoïde.	Antigène associé au carcinome épidermoïde
Dosage de l'antigène glucidique 724 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 72-4, qui peut servir de marqueur des tumeurs digestives. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 72-4
Dosage de l'antigène glucidique 242 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 242, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 242
Dosage du fragment de cytokératine 19 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Le dosage du fragment de cytokératine 19 est un indicateur important pour le diagnostic différentiel, le suivi thérapeutique et l'évaluation du pronostic du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC).	Fragment de cytokératine 19
Dosage de l'antigène glucidique 50 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 50, un marqueur tumoral. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 50



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Dosage de l'antigène glucidique 199 Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Mesure l'antigène glucidique 19-9, un marqueur des tumeurs digestives. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 19-9
Dosage de l'antigène prostatique spécifique libre Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur complémentaire du cancer de la prostate pouvant être utilisé dans son dépistage.	Antigène prostatique spécifique libre
Dosage de l'antigène prostatique spécifique total Dosage des marqueurs tumoraux	★	—	—	Marqueur spécifique utilisé pour le dépistage des tumeurs prostatiques ; une hyperplasie de la prostate ou une inflammation peut également entraîner une légère élévation.	Antigène prostatique spécifique total
Dosage quantitatif de l'antigène carcinoembryonnaire Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Marqueur tumoral à large spectre pouvant orienter notamment vers un cancer du rectum, du côlon, du poumon, du sein ou du pancréas.	Antigène carcinoembryonnaire (dosage quantitatif)
Dosage quantitatif de l'alpha-fœtoprotéine Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Peut orienter notamment vers un cancer primitif du foie, une tumeur embryonnaire des gonades ou une cirrhose.	Alpha-fœtoprotéine (dosage quantitatif)
Dosage de l'antigène glucidique 153 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 15-3, un marqueur tumoral présentant un intérêt pour le diagnostic du cancer du sein et le suivi postopératoire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 15-3
Dosage de l'antigène glucidique 125 Dosage des marqueurs tumoraux	—	★	★	Mesure l'antigène glucidique 125, un marqueur tumoral principalement utilisé comme aide au diagnostic des cancers ovariens séreux malins et épithéliaux, ainsi que pour le suivi après chirurgie et chimiothérapie du cancer de l'ovaire. Il est recommandé de l'interpréter avec d'autres marqueurs tumoraux.	Antigène glucidique 125



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Anticorps IgA dirigés contre l'antigène précoce du virus d'Epstein-Barr Dosage des marqueurs tumoraux	★	★	★	Recherche des anticorps associés au virus d'Epstein-Barr et constitue un indicateur du risque de cancer du nasopharynx.	Anticorps IgA dirigés contre l'antigène précoce du virus d'Epstein-Barr
Gastrine-17 Bilan de la fonction gastrique	★	★	★	La gastrine-17 reflète les lésions de la muqueuse gastrique, aide à évaluer la fonction de l'estomac et le risque de maladie gastrique, et renseigne sur le niveau d'acidité gastrique. Elle constitue un indicateur efficace pour le dépistage des affections précancéreuses gastriques et du cancer gastrique précoce.	Gastrine 17
Fonction gastrique—3 paramètres Bilan de la fonction gastrique	★	★	★	Évalue la sécrétion des glandes digestives de l'estomac afin d'aider à apprécier le risque de maladie gastrique.	Pepsinogène I ; Pepsinogène II ; Rapport des pepsinogènes (calculé)
Bilan thyroïdien—5 paramètres Bilan thyroïdien	★	★	★	Contribue au diagnostic des maladies ou des dysfonctionnements thyroïdiens et figure parmi les examens endocriniens les plus courants.	Thyréostimuline sérique ; Thyroxine sérique ; Triiodothyronine sérique ; Thyroxine libre sérique ; Triiodothyronine libre sérique
Glycémie à jeun Bilan du diabète	★	★	★	La glycémie correspond au taux de glucose dans le sang. Elle joue un rôle important dans l'évaluation du métabolisme glucidique, le diagnostic des troubles qui l'affectent et l'élaboration ou l'adaptation des traitements par les cliniciens.	Glycémie à jeun
Dosage de l'adiponectine (ADPN) Bilan du diabète	★	★	★	Mesure de l'adiponectine	Adiponectine
Hémoglobine glyquée Bilan du diabète	★	★	★	Reflète la glycémie des 2 à 3 mois précédents et constitue un indicateur utilisé dans le dépistage du diabète.	Hémoglobine glyquée (méthode biochimique)
Dosage des folates Bilan de l'anémie	★	★	★	Mesure les folates et peut, en association avec d'autres examens, contribuer au diagnostic de l'anémie et des tumeurs.	Folates



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Vitamine B12 Bilan de l'anémie	★	★	★	Mesure la vitamine B12. Associée à la NFS et à d'autres examens, cette analyse aide à rechercher les causes cliniques et les mécanismes de l'anémie, principalement de l'anémie mégaloblastique.	Vitamine B12 sérique
Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 Test respiratoire à l'urée	★	★	★	Test respiratoire recherchant une infection gastrique à Helicobacter pylori. Cette infection est étroitement associée à la gastrite, à l'ulcère gastroduodénal et au cancer de l'estomac.	Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13
Examens d'imagerie					
Échographie Doppler couleur de l'utérus et des annexes Échographie Doppler couleur courante—gynécologie	—	★	—	Permet de mieux visualiser l'utérus, les ovaires et les organes reproducteurs pelviens afin de rechercher des lésions.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie abdominale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie abdominale)
Échographie Doppler couleur du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, du pancréas et des reins Échographie Doppler couleur courante—abdomen	★	★	★	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur des deux reins ; Échographie Doppler couleur du foie ; Échographie Doppler couleur de la vésicule biliaire ; Échographie Doppler couleur de la rate ; Échographie Doppler couleur du pancréas
Échographie Doppler couleur de la prostate Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Visualise la forme et la taille de la prostate et contribue à l'évaluation d'affections telles que l'hyperplasie, l'augmentation de volume et les calcifications prostatiques. Fournit des images échographiques en coupe, dynamiques, en couleur et en haute définition à visée diagnostique.	Échographie Doppler couleur de la prostate
Échographie Doppler couleur de la vessie et des uretères Échographie Doppler couleur courante—appareil urinaire	★	—	—	Permet de mieux visualiser les organes pour rechercher une inflammation, des kystes, des tumeurs, des calculs ou une accumulation de liquide.	Échographie Doppler couleur de la vessie ; Échographie Doppler couleur des uretères



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Échographie Doppler couleur des carotides Échographie Doppler couleur des vaisseaux du cou	★	★	★	Recherche d'anomalies des grosses artères du cou, telles que des plaques, une sclérose ou un rétrécissement.	Échographie Doppler couleur des carotides
Échographie Doppler couleur de la thyroïde Échographie Doppler couleur des organes superficiels—glandes salivaires, thyroïde et ganglions cervicaux	★	★	★	Étudie la structure et la morphologie de la thyroïde afin de repérer des lésions anormales.	Échographie Doppler couleur de la thyroïde
Échographie Doppler couleur par voie vaginale Échographie Doppler couleur endocavitaire	—	—	★	Permet d'approcher directement les organes pelviens pour mieux visualiser les éventuelles lésions de l'utérus, des ovaires et du pelvis.	Échographie Doppler couleur de l'utérus (voie vaginale) ; Échographie Doppler couleur des annexes (voie vaginale)
Échocardiographie Doppler couleur	★	★	★	Méthode importante de diagnostic des maladies cardiovasculaires. Visualise en temps réel les structures des cavités cardiaques, les mouvements du cœur et le flux sanguin, avec un intérêt diagnostique notable pour les cardiopathies congénitales, les cardiomyopathies, la maladie coronarienne, les complications de l'infarctus du myocarde et le cœur pulmonaire.	Échocardiographie Doppler couleur
Échographie Doppler couleur des seins Échographie mammaire	—	★	★	Peut mettre en évidence des nodules mammaires ou d'autres lésions occupant de l'espace dans le sein.	Échographie mammaire
Examen du rachis cervical de profil Radiographie numérique (DR) du rachis cervical	★	★	★	Peut révéler une modification de la courbure cervicale, un pincement des espaces intervertébraux, des excroissances osseuses ou des calcifications ligamentaires.	Radiographie numérique du rachis cervical de profil



Examen / catégorie	Hommes	Femmes non mariées	Femmes mariées	Intérêt clinique	Éléments détaillés
Examen du rachis lombaire de profil Radiographie numérique (DR) du rachis lombaire	★	★	★	Permet d'examiner la structure osseuse et la morphologie des vertèbres lombaires, les disques intervertébraux, les processus épineux et les processus articulaires.	Radiographie numérique du rachis lombaire de profil
Scanner thoracique Scanner thoracique hélicoïdal à faible dose	★	★	★	Utilisé pour explorer les maladies des poumons, du cœur, de l'aorte, du médiastin et du diaphragme.	Scanner thoracique sans injection
IRM crânienne sans injection IRM crânienne	★	★	★	L'IRM peut être réalisée dans les situations suivantes : 1. Patients présentant un infarctus cérébral ou une hémorragie cérébrale. 2. Lésions vasculaires. 3. Patients présentant une infection virale, un abcès cérébral ou une méningite. 4. Patients atteints d'une tumeur cérébrale. 5. Nouveau-nés présentant des anomalies cérébrales.	IRM crânienne sans injection
Autres					
Petit-déjeuner Autres	★	★	★		
Prélèvement sanguin Autres	★	★	★		
Synthèse médicale du bilan Autres	★	★	★		



Informations & contact

Lecture des inclusions

★ = inclus pour la catégorie indiquée. Une cellule vide n'indique pas une inclusion. Les catégories féminines reprennent celles du programme du prestataire et ne constituent pas, à elles seules, des critères d'éligibilité médicale.

Périmètre médical et coordination

Les descriptions cliniques sont informatives et reprennent le programme du prestataire ; elles ne constituent ni des garanties indépendantes ni un avis médical. HIG coordonne les services, sans assurer de diagnostic ni de traitement, et n'est pas un service d'urgence.

Votre demande, en toute confidentialité

Pour une première demande, indiquez uniquement vos besoins de manière succincte. N'envoyez pas de dossier médical complet ni de pièce d'identité via les formulaires de contact généraux.

Demandes & coordination des réservations

contact@doutresgroup.com | <https://hig.doutresgroup.com/>

DOUTRES Group Limited

Société immatriculée à Hong Kong RAS · N° 78951710 · Pôles opérationnels : Hangzhou-Shanghai